

ИНСТРУКЦИИ ПОСЛЕ АНЕСТЕЗИИ



В течение 24 часов после проведения анестезии ребенок подвергается повышенному риску падения:

- Вполне вероятно, что остаток дня/вечера ребенок будет испытывать сонливость.
- Убедитесь, что ребенок находится в безопасном месте, а именно на кровати, диване.
- Ребенку должен иметь возможность легко вставать со спального места или места отдыха без лишних усилий.
- Процесс выздоровления лучше всего протекает, когда ребенок отдыхает или спит.
- Взрослому необходимо следить за ребенком, когда он ходит, ползает, обходит мебель и другие предметы с острыми углами, поднимается или спускается по ступенькам.
- Имейте в виду, что в течение 3 суток после процедуры ребенок может испытывать беспокойство и у него могут наблюдаться изменения в поведении.
- В течение 24 часов после процедуры не рекомендуются езда на велосипеде, скалолазание и занятия спортом.



Когда ребенок придет в себя после анестезии.

- Активность ребенка следует увеличивать постепенно, по мере того, как к нему возвращается чувство равновесия.
- Рекомендуется смотреть фильмы или телепередачи, играть в видеоигры и/или читать в спокойной обстановке.



Прием пищи и питья.

- Во время еды не следует торопиться, пища должна состоять из мягких, легких продуктов, таких как желе, крекеры и бульон. В течение 24 часов после процедуры может возникать тошнота. Следует избегать острой пищи.
- При отсутствии тошноты ребенок может постепенно переходить к обычному питанию.
- Если у ребенка рвота, подождите немного, прежде чем снова начинать давать ему прозрачные жидкости.
- Обязательно следуйте инструкциям стоматолога.
- Ребенок должен быть в состоянии помочиться через 6-8 часов после процедуры.



Устранение боли, дискомфорта или лихорадки.

- Боль и дискомфорт после процедуры – это нормальное и ожидаемое явление.
- Нередко возникают носовые кровотечения, которые могут происходить в течение как минимум первых 12 часов.
- Принимайте все лекарственные препараты, которые прописал ребенку врач/стоматолог.
- **Избегайте приема ибупрофена (препарат Мотрин) в течение 6 часов после процедуры.**
Очередную дозу можно принять в случае следующего.
- **При боли можно применять ацетаминофен (Тайленол).**
Очередную дозу можно принять в случае следующего.



После процедуры может наблюдаться субфебрильная температура (до 3100.4 F). В этом случае:

- Если это разрешено врачом, дайте пациенту жаропонижающее лекарственное средство.
- Поощряйте употребление жидкости, чтобы избежать обезвоживания.
- Следите за признаками инфекции (отек, покраснение, неприятный запах, выделения или длительная лихорадка).



В целях уменьшения боли у ребенка:

- Дайте обезболивающее лекарственное средство, если это разрешено лечащим врачом ребенка.
- Попытайтесь объяснить ребенку, что боль – это нормально, и она носит временный характер.
- Попытайтесь отвлечь его играми.
- Для облегчения боли используйте слабый источник тепла, если это разрешается врачом ребенка.
- Предложите ребенку глубоко дышать или пускать мыльные пузыри, чтобы отвлечься и помочь ему расслабиться.
- Успокаивающее прикосновение; попытайтесь обнимать, поглаживать, массировать, держать или покачивать ребенка.



Следующие симптомы могут вызывать беспокойство и могут потребовать дальнейшего наблюдения.

- Ребенок слишком сонный и просыпается с трудом.
- Сильные носовые кровотечения и/или головокружение или слабость у ребенка.
- Тошнота/рвота длится более 12 часов и/или ухудшается.
- Ребенок не мочится в течение 6-8 часов после процедуры.
- Ребенок испытывает боль, которую невозможно снять безрецептурными препаратами.
- Повышенная температура не снижается с помощью жаропонижающих препаратов или держится более 24 часов.
- Наблюдаются признаки инфекции (отек, покраснение, неприятный запах, выделения или длительная лихорадка).
- Выделения, кровотечение или отек в области стоматологической процедуры увеличиваются.

Если у вас возникнут какие-либо опасения по поводу симптомов у ребенка в нерабочее время или в случае возникновения чрезвычайной ситуации, немедленно обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи или позвоните 911.

В случае стоматологических проблем, обратитесь к стоматологу.

В случае проблем с анестезией. Повторные обращения относительно проблем с анестезией можно обсудить связавшись со SmileMD, с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 по Североамериканскому восточному времени.

- Телефон: (877) 789-8583
- Адрес электронной почты: patient-communications@smilemdsedation.com



www.OFFORHealth.com

118 Graceland Blvd. PMB 324
Columbus, OH 43214